




Universidade Luterana do Brasil – Campus Canoas
Curso de Fisioterapia



FUNCIONALIDADE DO PACIENTE CRÍTICO INTERNADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CANOAS

Rodrigues TB*, Fogassi AF, Barcellos LRS, Santos VFL, Santos LJ.


INTRODUÇÃO



OBJETIVO

Avaliar e comparar a funcionalidade do paciente durante a internação na UTI do Hospital Universitário Canoas.

METODOLOGIA




RESULTADOS

	n= 75
Idade, anos (mediana)	63 (17-94)
Sexo, masc (%)	68
Tempo de internação UTI	4 (1-25)
Tempo de internação hospitalar	11 (1-68)

Tabela 1. Características da amostra estudada

RESULTADOS

RESULTADOS FSS-ICU



- Na internação os pacientes apresentaram 13 (0-35) pontos na FSS-ICU e na alta da UTI foi de 24 (0-35) pontos, ($p < 0,0001$).

Gráfico 1. Resultados da funcionalidade dos pacientes através da FSS-ICU.

CONCLUSÃO

- Com esses resultados encontrados, ressaltamos a importância de protocolos de mobilização precoce no intuito de minimizar essa perda na funcionalidade dos pacientes críticos.

REFERÊNCIAS

- **SILVA**, V. et al. Versão brasileira da Escala de Estado Funcional em UTI: tradução e adaptação transcultural. Rev Bras Ter Intensiva. v. 29, n. 1, p. 34-38, 2017.
- **CHRISTAKOU**, A. et al. Functional Assessment Scales in a general intensive care unit. Hospital Chronicles, v. 8, n. 4, p. 164-170, 2013.
- **PARRY**, S. et al. Assessment of impairment and activity limitations in the critically ill: a systematic review of measurement instruments and their clinimetric properties. Intensive Care Med. v. 41 n. 5, p. 744-762, 2015.

OBRIGADA !

DESDE 2016

G E P A R T I

GRUPO DE ENSINO E PESQUISA EM
AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO EM
TERAPIA INTENSIVA

